

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	婦人科 1A (IFM+THP-ADM) 療法		臨床区分	抗癌剤適応分類	登録日	2012年8月4日	
疾患名			☒ 日常診療 ☐ 単施設自主研究 ☐ 他施設自主研究 ☐ 市販後臨床研究 ☐ 治験	☐ 進行・再発化学療法 ☐ 術後化学療法 ☐ 術前化学療法 ☐ 局所療法 ☐ その他			
診療科名	婦人科				1クール期間	28日	
登録医師名	早瀬 良二				実施回数	/回	

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	day2	day3	day4	day5	—	—	—	—	—	
1	生理食塩液	500	mL	点滴静注	メイン	120min	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	
2	グラニセトロン点滴静注液3mgバック	1	袋	点滴静注	側管	15min	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	
	デキサート注射液 6.6mg	1	瓶														
3	5%糖液	100	mL	点滴静注	側管	全開	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	ピノルビン注射用	30	mg/m2														
4	ウロミテキサン注	400	mg	静注	側管	5min	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	イホマイド投与直前、以後4時間毎
	生理食塩液	20	mL														
5	生理食塩液	500	mL	点滴静注	側管	120min	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	
	注射用イホマイド	1.5	g/body														
6	ソルデム3A輸液	500	mL	点滴静注	メイン	120min	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	
7	ウロミテキサン注	400	mg	静注	側管	5min	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	イホマイド投与直前、以後4時間毎
	生理食塩液	20	mL														
8	ソルアセトD輸液	500	mL	点滴静注	メイン	120min	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	
9	ソルデム3A輸液	500	mL	点滴静注	メイン	120min	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	
10	ウロミテキサン注	400	mg	静注	側管	5min	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	イホマイド投与直前、以後4時間毎
	生理食塩液	20	mL														
※	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●										※ピノルビン後のルート洗浄用
12																	

備考欄

減量・中止基準

文献