

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	婦人科 PTX (80mg/m ²) +BEV療法		臨床区分 ☒ 日常診療 ☐ 単施設自主研究 ☐ 他施設自主研究 ☐ 市販後臨床研究 ☐ 治験	抗癌剤適応分類 ☒ 進行・再発化学療法 ☐ 術後化学療法 ☐ 術前化学療法 ☐ 局所療法 ☐ その他	登録日	2015年10月20日	
疾患名	卵巣癌				1クール期間	21日	
診療科名	婦人科					実施回数	/回
登録医師名	澤田 麻里						

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日									注意コメント	
							day1	—	—	day8	—	—	day15	—	—		—
1	レスタミンコーワ錠 10mg	5	錠	経口			●	—	—	●	—	—	●	—	—	—	パクリタキセル投与開始30分前までに内
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	●	—	—	●	—	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを 装着すること
3	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	15min	●	—	—	●	—	—	●	—	—	—	レスタミンと同時投与（レスタミン内服 不可患者には医師に確認）
	デキサート注射液 6.6mg	1	瓶				●	—	—	●	—	—	●	—	—		
	ファモチジン静注20mg	1	管				●	—	—	●	—	—	●	—	—		
4	グラニセトロン点滴静注液3mgバック	1	袋	点滴静注	側管	30min	●	—	—	●	—	—	●	—	—	—	
5	生理食塩液	250	mL	点滴静注	側管	60min	●	—	—	●	—	—	●	—	—	—	フィルター付き点滴セット使用
	パクリタキセル注	80	mg/m2				●	—	—	●	—	—	●	—	—		
							●	—	—	●	—	—	●	—	—		
6	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	90min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	初回90min、忍容が確認できれば、2回 目60min、3回目以降 30minに変更 可
	アバズチン点滴静注用	15	mg/kg														
7																	

備考欄

減量・中止基準

文献