

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	婦人科 TCweekly (PTX+CBDCA) 療法【7日間】		臨床区分 ☒ 日常診療 ☐ 単施設自主研究 ☐ 他施設自主研究 ☐ 市販後臨床研究 ☐ 治験	抗癌剤適応分類 ☒ 進行・再発化学療法 ☐ 術後化学療法 ☐ 術前化学療法 ☐ 局所療法 ☐ その他	登録日	2017年11月1日
疾患名	卵巣癌					
診療科名	婦人科					
登録医師名	山本 暖					
					1クール期間	7日
					実施回数	/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	レスタミンコーワ錠 10mg	3	錠	経口			●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	パクリタキセル投与開始30分前までに内
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
3	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	15min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	レスタミンと同時投与（レスタミン内服不可患者には医師に確認）
	デキサート注射液 6.6mg	1.5	瓶														
4	生理食塩液	1	管	点滴静注	側管	30min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	ファモチジン注射液 20mg	1	管														
5	生理食塩液	250	mL	点滴静注	側管	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	フィルター付き点滴セット使用
	パクリタキセル注	80	mg/m2														
6	生理食塩液	250	mL	点滴静注	側管	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	カルボプラチン点滴静注液	2	AUC														
7																	

備考欄

減量・中止基準

好中球数1000/ μ L以下
血小板数7.5万/ μ L以下

文献

Weekly carboplatin and paclitaxel is safe, active, and well tolerated in recurrent ovarian cancer cases of Japanese women previously treated with cisplatin-containing multidrug chemotherapy