

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	婦人科 Tweekly (PTX) 療法		臨床区分	抗癌剤適応分類	登録日	2012年8月4日	
疾患名			☒ 日常診療 ☐ 単施設自主研究 ☐ 他施設自主研究 ☐ 市販後臨床研究 ☐ 治験	☐ 進行・再発化学療法 ☐ 術後化学療法 ☐ 術前化学療法 ☐ 局所療法 ☐ その他	1クール期間	28日	
診療科名	婦人科				実施回数	/回	
登録医師名	早瀬 良二						

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日								注意コメント			
							day1	—	day8	—	day15	—	day22	—		—	—	
1	レスタミンコーワ錠 10mg	3	錠	経口			●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	パクリタキセル投与開始30分前までに内	
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを 装着すること	
3	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	15min	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	レスタミンと同時投与（レスタミン内服 不可患者には医師に確認）	
	デキサート注射液 6.6mg	1	瓶				●	—	●	—	●	—	●	—	—	—		
	ファモチジン注射液 20mg	1	管				●	—	●	—	●	—	●	—	—	—		
4	グラニセトロン点滴静注液3mgバック	1	袋	点滴静注	側管	30min	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—		
							●	—	●	—	●	—	●	—	—	—		
5	生理食塩液	250	mL	点滴静注	側管	60min	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	フィルター付き点滴セット使用	
	パクリタキセル注	60	mg/m2				●	—	●	—	●	—	●	—	—	—		
6																		

備考欄

減量・中止基準

文献