

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	外科 アーピタックス療法		臨床区分 ☒ 日常診療 ☐ 単施設自主研究 ☐ 他施設自主研究 ☐ 市販後臨床研究 ☐ 治験	抗癌剤適応分類 ☒ 進行・再発化学療法 ☐ 術後化学療法 ☐ 術前化学療法 ☐ 局所療法 ☐ その他	登録日	2012年8月4日
疾患名	大腸癌					
診療科名	外科					
登録医師名	岩川 和秀					
					1クール期間	7日
					実施回数	/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	レスタミンコーワ錠10mg	5	錠	経口			●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	生理食塩液	100	mL				●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	30min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
	デキサート注射液 6.6mg	1	瓶														
4	生理食塩液	300	mL	点滴静注	側管	120min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2回目以降 250mg/m ² を60minで投与 2回目は生理食塩液250mLに混注 (予備容量：140mL) ※濃度0.83～4mg/mLになるよう調製する。 アーピタックス投与終了後、1時間は経過観察すること。
	アーピタックス注射液	400	mg/m2														
5		2回目以降250	mg/m2														

備考欄

減量・中止基準

文献