

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	外科 アービタックス+CPT-11療法：毎週投与法		臨床区分	抗癌剤適応分類	登録日	2012年8月4日	
疾患名	大腸癌		☒ 日常診療 ☐ 単施設自主研究 ☐ 他施設自主研究 ☐ 市販後臨床研究 ☐ 治験	☒ 進行・再発化学療法 ☐ 術後化学療法 ☐ 術前化学療法 ☐ 局所療法 ☐ その他	1クール期間	42日	
診療科名	外科				実施回数	/回	
登録医師名	岩川 和秀						

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	day8	day15	day22	day29	day36	—	—	—	—	
1	レスタミンコーワ錠10mg	5	錠	経口			●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	備考欄参照
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
3	グラニセトロン点滴静注液3mgバック デキサート注射液 6.6mg	1 1	袋 瓶	点滴静注	側管	30min	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	
4	生理食塩液 デキサート注射液 6.6mg	100 1	mL 瓶	点滴静注	側管	30min	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	
5	生理食塩液 アービタックス注射液	300 400	mL mg/m2	点滴静注	側管	120min	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	2回目以降 250mg/m ² を60minで投与 2回目は生理食塩液250mLに混注 (予備容量：140mL) ※濃度0.83～4mg/mLになるよう調製する。 7-ビ タックス投与終了後、1時間は経過観察すること。
6	5%糖液 イリノテカン塩酸塩点滴静注液	250 100	mL mg/m2	点滴静注	側管	90min	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	
7																	

備考欄

減量・中止基準

文献