

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

|        |              |  |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |        |            |    |
|--------|--------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----|
| レジメン名称 | 外科 SOX+BEV療法 |  | 臨床区分<br><input checked="" type="checkbox"/> 日常診療<br><input type="checkbox"/> 単施設自主研究<br><input type="checkbox"/> 他施設自主研究<br><input type="checkbox"/> 市販後臨床研究<br><input type="checkbox"/> 治験 | 抗癌剤適応分類<br><input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法<br><input type="checkbox"/> 術後化学療法<br><input type="checkbox"/> 術前化学療法<br><input type="checkbox"/> 局所療法<br><input type="checkbox"/> その他 | 登録日    | 2013年8月15日 |    |
| 疾患名    | 大腸癌          |  |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 | 1クール期間 | 21日        |    |
| 診療科名   | 外科           |  |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |        | 実施回数       | /回 |
| 登録医師名  | 宮宗 秀明        |  |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |        |            |    |

| Rp | 薬品名称                                 | 標準投与量      | 単位          | 投与方法 | ルート | 投与時間   | 投与日  |   |   |   |   |   |       |   |   |   | 注意コメント                                                 |
|----|--------------------------------------|------------|-------------|------|-----|--------|------|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|--------------------------------------------------------|
|    |                                      |            |             |      |     |        | day1 | — | — | — | — | — | day14 | — | — | — |                                                        |
| 1  | S-1                                  | 80~120     | mg          | 経口   |     |        | ●    | → | → | → | → | → | 休     |   |   |   | 備考欄参照                                                  |
| 2  | 生理食塩液                                | 100        | mL          | 点滴静注 | メイン |        | ●    | — | — | — | — | — | —     | — | — | — | 血管確保用<br>※開始から終了までECGモニターを装着すること                       |
| 3  | グラニセトロン点滴静注液3mgバック<br>デキサート注射液 6.6mg | 1<br>2     | 袋<br>瓶      | 点滴静注 | 側管  | 30min  | ●    | — | — | — | — | — | —     | — | — | — |                                                        |
| 4  | 生理食塩液<br>ペバシズマブ点滴静注                  | 100<br>7.5 | mL<br>mg/kg | 点滴静注 | 側管  | 90min  | ●    | — | — | — | — | — | —     | — | — | — | 初回投与の忍容性が良ければ、2回目の投与を60分で、さらに2回目の忍容性も良ければそれ以降は30分で投与可能 |
| 5  | 5%糖液<br>オキシリプラチン点滴静注液                | 250<br>130 | mL<br>mg/m2 | 点滴静注 | 側管  | 120min | ●    | — | — | — | — | — | —     | — | — | — | TS-1が処方されているか確認すること。                                   |
| 6  |                                      |            |             |      |     |        |      |   |   |   |   |   |       |   |   |   |                                                        |

備考欄  
TS-1 2×(14)MA 内服処方1.25m<sup>2</sup>未満 80mg/日、1.25~1.5m<sup>2</sup>未満 100mg/日、1.5m<sup>2</sup>以上 120mg/日

減量・中止基準

文献  
SOFT試験