

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称
乳腺・甲状腺外科 3週毎 PER+ TRA + DTX療法

疾患名
乳癌

診療科名
乳腺・甲状腺外科

登録医師名
野村 長久

臨床区分
☒ 日常診療
☐ 単施設自主研究
☐ 他施設自主研究
☐ 市販後臨床研究
☐ 治験

抗癌剤適応分類
☒ 進行・再発化学療法
☐ 術後化学療法
☐ 術前化学療法
☐ 局所療法
☐ その他

登録日
2013年11月1日

1クール期間
21日

実施回数
/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
2	生理食塩液	250	mL	点滴静注	側管	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1) 初回投与時のみ840mg (2回目以降420mg) ※初回投与の忍容性が良好であれば、投与時間30minまで短縮可能 2) 投与終了後、60分の経過観察を行う。 ※初回投与の忍容性があれば、観察期間は30minまで短縮可能
	パージェタ点滴静注 420mg	840	mg/body														
3		2回目以降：420	mg/body														
	生理食塩液	250	mL	点滴静注	側管	90min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1) 初回投与時のみ8mg/kg (2回目以降6mg/kg) ※初回投与の忍容性が良好であれば、投与時間30minまで短縮可能
	トラスツズマブBS点滴静注用	8	mg/kg														
4		2回目以降：6	mg/kg														
	グラニセトロン点滴静注液3mg/バック	1	袋	点滴静注	側管	30min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	デキサード注射液 6.6mg	2	瓶														
5				点滴静注	側管	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	5%糖液	250	mL														
6	下セタキセル点滴静注液	75	mg/m2														
		(55~75)	mg/m2														

備考欄

減量・中止基準

文献

Pertuzumab,trastuzumab,and docetaxel for HER2-positive metastatic breast cancer(CLEOPATRA study):overall survival results from arandomised,duuble-blind,placebo-controlled,phase 3 study