

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	乳腺・甲状腺外科 GT (GEM+PTX) Weekly療法		臨床区分 ☒ 日常診療 ☐ 単施設自主研究 ☐ 他施設自主研究 ☐ 市販後臨床研究 ☐ 治験	抗癌剤適応分類 ☐ 進行・再発化学療法 ☐ 術後化学療法 ☐ 術前化学療法 ☐ 局所療法 ☐ その他	登録日	2012年12月1日
疾患名	乳癌					
診療科名	乳腺・甲状腺外科					
登録医師名	野村 長久					
			1クール期間			21日
			実施回数			/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	—	—	day8	—	—	—	—	—	—	
1	レスタミンコーワ錠 10mg	5	錠	経口			●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	パクリタキセル投与開始30分前までに内
2	生理食塩液	100	mL				●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	
3	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを 装着すること
3	デキササート注射液 6.6mg ファモチジン注射液 20mg	1 1	瓶 管				●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	
5	グラニセトロン点滴静注液3mgバック	1	袋	点滴静注	側管	15min	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	レスタミンと同時投与（レスタミン内服 不可患者には医師に確認）
6	5%糖液	250	mL				●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	
6	パクリタキセル注	100	mg/m2	点滴静注	側管	60min	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	フィルター付き点滴セット使用
7	生理食塩液	100	mL				●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	
7	ゲムシタピン点滴静注用	1000	mg/m2	点滴静注	側管	30min	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	
8																	

備考欄

減量・中止基準

文献