

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	乳腺・甲状腺外科 GT (GEM+PTX) 療法		臨床区分	抗癌剤適応分類	登録日	2012年12月1日	
疾患名	乳癌		☒ 日常診療 ☐ 単施設自主研究 ☐ 他施設自主研究 ☐ 市販後臨床研究 ☐ 治験	☐ 進行・再発化学療法 ☐ 術後化学療法 ☐ 術前化学療法 ☐ 局所療法 ☐ その他	1クール期間	21日	
診療科名	乳腺・甲状腺外科				実施回数	/回	
登録医師名	野村 長久						

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	—	—	day8	—	—	—	—	—	—	
1	レスタミンコーワ錠 10mg	5	錠	経口			●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	パクリタキセル投与開始30分前までに内
2	生理食塩液	100	mL				●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	
3	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	15min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
	デキサート注射液 6.6mg	3	瓶														
	ファモチジン注射液 20mg	1	管														レスタミンと同時投与（レスタミン内服不可患者には医師に確認）
4	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	15min	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	
	デキサート注射液 6.6mg	1	瓶														
5	グラニセトロン点滴静注液3mgバック	1	袋	点滴静注	側管	30min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	5%糖液	500	mL	点滴静注	側管	180min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	フィルター付き点滴セット使用 パクリタキセル濃度（0.3～1.2mg/mL）になるように調製（液量
	パクリタキセル注	175	mg/m2														
7	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	30min	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	
	ゲムジタピン点滴静注用	1250	mg/m2														
8																	

備考欄

減量・中止基準

文献