

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	乳腺・甲状腺外科 <i>GeTHer (GEM+PTX+Her) 療法</i>		臨床区分 ☒ 日常診療 ☐ 単施設自主研究 ☐ 他施設自主研究 ☐ 市販後臨床研究 ☐ 治験	抗癌剤適応分類 ☐ 進行・再発化学療法 ☐ 術後化学療法 ☐ 術前化学療法 ☐ 局所療法 ☐ その他	登録日	2012年12月1日	
疾患名	乳癌				1クール期間	21日	
診療科名	乳腺・甲状腺外科					実施回数	/回
登録医師名	野村 長久						

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日									注意コメント	
							day1	—	—	day8	—	—	day15	—	—		—
1	レスタミンコーワ錠 10mg	5	錠	経口			●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	パクリタキセル投与開始30分前までに内
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	●	—	—	●	—	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
3	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	15min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	レスタミンと同時投与（レスタミン内服不可患者には医師に確認）
	デキサート注射液 6.6mg	3	瓶														
4	ファモチジン注射液 20mg	1	管	点滴静注	側管	30min	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	
	グラニセトロン点滴静注液3mg/バック	1	袋														
5	デキサート注射液 6.6mg	1	瓶	点滴静注	側管	30min	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	
	グラニセトロン点滴静注液3mg/バック	1	袋				●	—	—	—	—	—	—	—	—		
6	5%糖液	500	mL	点滴静注	側管	180min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	フィルター付き点滴セット使用 パクリタキセル濃度（0.3～1.2mg/mL）になるように調製（液量
	パクリタキセル注	175	mg/m2				●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	30min	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	
	ゲムシタピン点滴静注用	1200	mg/m2				●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	
8	生理食塩液	250	mL	点滴静注	側管	90min	●	—	—	●	—	—	●	—	—	—	初回投与時のみ4mg/kg 2回目以降2mg/kg ※フィルターを通さず投与 初回投与の忍容性があれば、投与時間30minまで短縮可能
	トラスツズマブ点滴静注	4	mg/kg				●	—	—	●	—	—	●	—	—	—	
9		2回目以降：2	mg/kg														

備考欄

減量・中止基準

文献