

## 国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	乳腺・甲状腺外科 MMC療法						登録日	2012年12月1日													
疾患名	乳癌					臨床区分															
診療科名	乳腺・甲状腺外科					<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療							<input type="checkbox"/> 単施設自主研究	<input type="checkbox"/> 他施設自主研究	<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究	<input type="checkbox"/> 治験	<input type="checkbox"/> 進行・再発化学療法	<input type="checkbox"/> 術後化学療法	<input type="checkbox"/> 術前化学療法	<input type="checkbox"/> 局所療法	<input type="checkbox"/> その他
登録医師名	野村 長久					<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1クール期間	7日																				
実施回数	/回																				
Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント				
1	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		day1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	血管確保用			
2	生理食塩液	100	mL				●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—		
	テキサート注射液 6.6mg	1	瓶				●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—		
3	生理食塩液	50	mL	点滴静注	側管	30min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	マイトマイシン注用	4~6	mg				●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—		
4	注射用水	適宜	mL				●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	マイトマイシン注用溶解用 (2mgあたり5mLで溶解)
5																					

備考欄

減量・中止基準

文献