

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	乳腺・甲状腺外科 weekly I-I ⁺ T ⁺ + GEM療法		臨床区分 ☒ 日常診療 ☐ 単施設自主研究 ☐ 他施設自主研究 ☐ 市販後臨床研究 ☐ 治験	抗癌剤適応分類 ☐ 進行・再発化学療法 ☐ 術後化学療法 ☐ 術前化学療法 ☐ 局所療法 ☐ その他	登録日	2012年12月1日		
疾患名	乳癌				1クール期間	21日		
診療科名	乳腺・甲状腺外科					実施回数	/回	
登録医師名	野村 長久							

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日									注意コメント	
							day1	—	—	day8	—	—	day15	—	—		—
1	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	●	—	—	●	—	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
2	グラニセトロン点滴静注液3mgバック	1	袋	点滴静注	側管	30min	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	
	デキサート注射液 6.6mg	1	瓶														
3	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	30min	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	
	ゲムシタピン点滴静注用	1250	mg/m2														
4	生理食塩液	250	mL	点滴静注	側管	90min	●	—	—	●	—	—	●	—	—	—	初回投与時のみ4mg/kg 2回目以降2～3mg/kg 初回投与の忍容性があれば、投与時間30minまで短縮可能
	トラスツスマブ点滴静注	4	mg/kg														
5		2回目以降2～3	mg/kg														

備考欄

減量・中止基準

文献