

## 国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	乳腺・甲状腺外科 weekly ハイブリッド+PTX療法 7日						臨床区分	抗癌剤適応分類						登録日	2012年12月1日			
疾患名	乳癌									<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療		<input type="checkbox"/> 進行・再発化学療法				1クール期間	7日	
診療科名	乳腺・甲状腺外科									<input type="checkbox"/> 単施設自主研究		<input type="checkbox"/> 術後化学療法						
登録医師名	野村 長久			<input type="checkbox"/> 他施設自主研究		<input type="checkbox"/> 術前化学療法		<input type="checkbox"/> 局所療法										
						<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究		<input type="checkbox"/> その他		実施回数		/回						
Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント	
							day1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1	レスタミンコーウ錠10mg	5	錠	経口			●									パクリタキセル投与開始30分前までに内		
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	-	-	-	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを 装着すること		
3	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	15min	●									レスタミンと同時投与（レスタミン内服 不可患者には医師に確認）		
	テキサート注射液 6.6mg	1	瓶															
4	ファモチジン注射液 20mg	1	管	点滴静注	側管	30min	●	-	-	-	-	-	-	-	-			
	グラニセトロン点滴静注液3mg/バック	1	袋															
5	5%糖液	250	mL	点滴静注	側管	60min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	フィルター付き点滴セット使用		
	パクリタキセル注	80~100	mg/m <sup>2</sup>															
6	生理食塩液	250	mL	点滴静注	側管	90min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	初回投与時のみ4mg/kg 2回目以降2~3mg/kg 初回投与の忍容性があれば、投与時間30minまで 短縮可能		
	トラスツズマブ点滴静注	4	mg/kg															
7																		

備考欄

--

減量・中止基準

--

文献

--