

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	外科 Herceptin+XELOX (XELODA+L-OHP) 療法		臨床区分	抗癌剤適応分類	登録日	2016年1月6日	
疾患名	胃癌		☒ 日常診療 ☐ 単施設自主研究 ☐ 他施設自主研究 ☐ 市販後臨床研究 ☐ 治験	☒ 進行・再発化学療法 ☐ 術後化学療法 ☐ 術前化学療法 ☐ 局所療法 ☐ その他	1クール期間	21日	
診療科名	外科				実施回数	/回	
登録医師名	濱野 亮輔						

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	—	—	—	—	—	day14	—	—	—	
1	カベシタピン錠			経口			●	→	→	→	→	→	休				
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
3	生理食塩液 トラスツズマブ注射用	250 6~8	mL mg/kg	点滴静注	メイン	90min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	初回投与時のみ8mg/kg 2回目以降 6mg/kg 初回：90min 2回目以降：30minも可
4	グラニセトロン点滴静注液3mgバック デキサート注射液 6.6mg	1 1.5	袋 瓶	点滴静注	メイン	30min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	5%糖液 オキサリプラチン点滴静注液	250 130	mL mg/m2	点滴静注	メイン	120min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ゼローダが処方されているか確認すること
6																	
7																	

備考欄

① 2×(14)MA 内服処方
 1.36m²未満 1200mg/回、1.36m²以上1.66m²未満 1500mg/回
 1.66m²以上1.96m²未満 1800mg/回、1.96m²以上 2100mg/回
 day1夕～day15朝

文献

Multicenter phase II study of trastuzumab in combination with capecitabine and oxaliplatin for advanced gastric cancer

減量・中止基準