

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	呼吸器内科 IFM+EPI療法		臨床区分 ☐ 日常診療 ☐ 単施設自主研究 ☐ 他施設自主研究 ☐ 市販後臨床研究 ☐ 治験	抗癌剤適応分類 ☐ 進行・再発化学療法 ☐ 術後化学療法 ☐ 術前化学療法 ☐ 局所療法 ☐ その他	登録日	2012年10月1日
疾患名						
診療科名	呼吸器内科					
登録医師名	玄馬 顕一					
			1クール期間	21日		
			実施回数	/回		

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	day2	day3	day4	day5	—	—	—	—	—	
1	生理食塩液	500	mL	点滴静注	メイン	2.5h	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	
2	クラニセトロン点滴静注液3mgバック デキサート注射液 6.6mg	1 1	袋 瓶	点滴静注	側管	15min	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	
3	生理食塩液	50	mL	点滴静注	側管	全開で	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	
	エビルピシン塩酸塩注射用	60	mg/m2														
4	ウロミテキサン注	400	mg	静注	側管	緩徐に	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	イホマイド投与前、以後、4時間毎
	生理食塩液	20	mL														
5	生理食塩液	500	mL	点滴静注	側管	2h	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	
	注射用イホマイド	1800	mg/m2														
6	ソルデム3A輸液	500	mL	点滴静注	メイン	1.5h	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	
7	ソルデム3A輸液	500	mL	点滴静注	メイン	1.5h	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	
8	ウロミテキサン注	400	mg	静注	側管	緩徐に	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	イホマイド投与前、以後、4時間毎
	生理食塩液	20	mL														
9	ソルアセトD輸液	500	mL	点滴静注	メイン	1.5h	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	
10	ウロミテキサン注	400	mg	静注	側管	緩徐に	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	イホマイド投与前、以後、4時間毎
	生理食塩液	20	mL														
※	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	●									※エビルピシン後のルート洗浄用

備考欄

減量・中止基準

文献