

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	内科 Liposomal Doxorubicin (ドキシル) 療法		臨床区分 ☒ 日常診療 ☐ 単施設自主研究 ☐ 他施設自主研究 ☐ 市販後臨床研究 ☐ 治験	抗癌剤適応分類 ☐ 進行・再発化学療法 ☐ 術後化学療法 ☐ 術前化学療法 ☐ 局所療法 ☒ その他	登録日	2017年5月22日	
疾患名	カボジ肉腫				1クール期間	21日	
診療科名	内科					実施回数	6回
登録医師名	齋藤 誠司						

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	day2	day3	day4	day5	day6	day7	day8	day9	day15	
1	5%糖液	100	mL	点滴静注	メイン		●										血管確保用 ※ドキシル投与前後のバイアラック用 ※開始から終了までECGモニターを 装着すること
2	グラセトロン点滴静注液3mgバック	100	mL	点滴静注	メイン	15min	●										
3	5%糖液 ドキシル注	250 20	mL mg/m2	点滴静注	メイン	60min	●										1)ドキシル投与前後のバイアラックを行う。 2)基本投与時間60min（1mg/minを超えない速度で投与 60min以上になる場合は医師に確認する。） 3）バイアラック-を使用しないこと。 4）手足症候群予防のため手足をクーリング する。
4																	

備考欄

心毒性の為総投与量500mg/m²までとすること

減量・中止基準

好中球<1500または血小板<75000で休薬

文献

AIDSに合併するカボジ肉腫等のHHV-8関連疾患における診断と治療の手引き第2版および添付文章