

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	子宮頸癌 Pembrolizumab+TP (PTX+CDDP) 療法	臨床区分	抗癌剤適応分類	登録日	2022年11月2日
疾患名	子宮頸癌			※2023/6/29 改変	
診療科名	婦人科			1クール期間	21日
登録医師名	山本 暖			実施回数	6/回
適応	化学療法未治療の手術又は放射線療法による根治治療の対象となる進行・再発の子宮頸癌				

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	day2	day3	—	—	—	—	—	—	—	
1	アフレピタントカプセル125mg	1	錠	経口			●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	抗がん剤投与1時間～1時間30分前に内服
2	アフレピタントカプセル80mg	1	錠	経口			—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	2日目以降、午前中内服
3	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	血管確保用（フィルター付ルートを使用すること） ※開始から終了までECGモニターを装着すること
4	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	30min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	最終濃度：1～10mg/mL以上 インラインフィルターを使用すること。 キイトルーダ投与前後生食でフラッシュ
5	生理食塩液	50	mL	点滴静注	側管		●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	キイトルーダ後ルート洗浄用
6	レスタミンシーコーワ錠 10mg	5	錠	経口			●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	パクリタキセル投与開始30分前に内服
7	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	30min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	レスタミンと同時投与（レスタミン内服不可患者には医師に確認） 投与終了後、パクリタキセル開始まで30分以上あける
8	デキサメトロニド注射液 6.6mg パロフセトロジン静注用 0.75mg パラモズジン注射液 20mg	3 1 1	瓶 瓶 管	点滴静注	側管	30min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	パクリタキセル投与までの待機用
9	生理食塩液	500	mL	点滴静注	側管	180min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	インラインフィルターを使用すること。
10	ソルテム3A輸液 静注用マグネソール	500 0.5	mL 管	点滴静注	側管	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	20%マンニットールS注射液	300	mL	点滴静注	側管	30min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	生理食塩液 ジスプラチニン注	300 50	mL mg/m2	点滴静注	側管	120min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	ソルテム3A輸液	500	mL	点滴静注	側管	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	ソルアセトD輸液	500	mL	点滴静注	側管	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	ソルテム3A輸液 デキサメトロニド注射液 6.6mg	500 1	mL 瓶	点滴静注	側管	60min	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	
16	ソルテム3A輸液	500	mL	点滴静注	側管	60min	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	
17	ソルアセトD輸液	500	mL	点滴静注	側管	60min	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	

備考欄

※6コース終了後はPembrolizumab維持療法へ移行する
※キイトルーダとパクリタキセルはフィルターを使用する
※放射線増感剤としての化学療法歴は化学療法未治療として扱う
※アバスチンが必要な症例はアバスチン入りのレジメンを選択すること

減量・中止基準

各薬剤の添付文書・適正使用ガイド参照

文献

Pembrolizumab for Persistent, Recurrent, or Metastatic Cervical Cancer, N Engl J Med 2021; 385: 1856-67, KEYNOTE-826試験