

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	子宮頸癌 TP (PTX+CCDP) 療法
疾患名	子宮頸癌
診療科名	婦人科
登録医師名	早瀬 良二

臨床区分

☒ 日常診療
☐ 単施設自主研究
☐ 他施設自主研究
☐ 市販後臨床研究
☐ 治験

抗癌剤適応分類

☐ 進行・再発化学療法
☐ 術後化学療法
☐ 術前化学療法
☐ 局所療法
☐ その他

登録日	2012年8月4日
1クール期間	21日
実施回数	/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	day2	day3	—	—	—	—	—	—	—	
1	アプレビタントカプセル125mg	1	錠	経口			●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	抗がん剤投与1時間～1時間30分前に内服
2	アプレビタントカプセル80mg	1	錠	経口			—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	2日目以降、午前中内服
3	レスタミンコーワ錠 10mg	5	錠	経口			●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	パクリタキセル投与開始30分前までに内服
4	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
5	生理食塩液 デキサート注射液 6.6mg フアモチジン注射液 20mg	100 3 1	mL 瓶 管	点滴静注	側管	15min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	レスタミンと同時投与（レスタミン内服不可患者には医師に確認）
6	生理食塩液 パロノセドロン静注0.75mg	100 1	mL 瓶	点滴静注	側管	30min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	生理食塩液 パクリタキセル注	500 175～180	mL mg/m2	点滴静注	側管	180min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	フィルター付き点滴セット使用
8	ソルデム3A輸液 静注用マグネソール	500 0.5	mL 管	点滴静注	側管	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	20%マンニトールS注射液	300	mL	点滴静注	側管	30min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	生理食塩液 シスプラチン点滴静注	300 70	mL mg/m2	点滴静注	側管	120min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	ソルデム3A輸液	500	mL	点滴静注	側管	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	ソルアセトD輸液	500	mL	点滴静注	側管	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	ソルデム3A輸液 デキサート注射液 6.6mg	500 1	mL 瓶	点滴静注	メイン	60min	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	
14	ソルデム3A輸液	500	mL	点滴静注	メイン	60min	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	
15	ソルアセトD輸液	500	mL	点滴静注	メイン	60min	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	

備考欄

減量・中止基準

文献