

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	子宮頸癌 TweeklyC (PTX+CBDCA) 療法		臨床区分 ☒ 日常診療 ☐ 単施設自主研究 ☐ 他施設自主研究 ☐ 市販後臨床研究 ☐ 治験	抗癌剤適応分類 ☐ 進行・再発化学療法 ☐ 術後化学療法 ☐ 術前化学療法 ☐ 局所療法 ☐ その他	登録日	2012年8月4日	
疾患名	子宮頸癌				(2023/3/2改訂)		
診療科名	婦人科				1クール期間	28日	
登録医師名	早瀬 良二				実施回数	/回	

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日									注意コメント
							day1	—	—	day8	—	—	day15	—	—	
1	アプレピタントカプセル125mg	1	Cap	経口			●	—	—	—	—	—	—	—	—	抗がん剤開始1時間～1時間30分前に内服 day2～3のアプレピタントは別途処方 パクリタキセル投与開始30分前までに内服
	レスタミンコーワ錠 10mg	3	錠				●	—	—	●	—	—	●	—	—	
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	●	—	—	●	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
	生理食塩液	100	mL				●	—	—	●	—	—	●	—	—	
3	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	15min	●	—	—	●	—	—	●	—	—	レスタミンと同時投与（レスタミン内服不可患者には医師に確認）
	デキサート注射液 6.6mg	1.5	瓶				●	—	—	●	—	—	●	—	—	
4	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	30min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	
	バロノセトロン静注用0.75mg	1	瓶				●	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	30min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	
	生理食塩液	100	mL				●	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	グラニセトロン点滴静注液1mgバック	1	袋	点滴静注	側管	30min	—	—	—	●	—	—	●	—	—	
	生理食塩液	250	mL				—	—	—	●	—	—	●	—	—	
7	生理食塩液	250	mL	点滴静注	側管	60min	●	—	—	●	—	—	●	—	—	フィルター付き点滴セット使用
	パクリタキセル注	60	mg/m2				●	—	—	●	—	—	●	—	—	
8	生理食塩液	250	mL	点滴静注	側管	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	最大投与量：800mgまで
	カルボプラチン点滴静注液	5～6	AUC				●	—	—	—	—	—	—	—	—	

備考欄

減量・中止基準

文献