

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	子宮体癌 6週毎 Pembrolizumab+Lenvatinib併用療法		臨床区分	抗癌剤適応分類	登録日	2022年3月2日
疾患名	子宮体癌		☒ 日常診療 ☐ 単施設自主研究 ☐ 他施設自主研究 ☐ 市販後臨床研究 ☐ 治験	☒ 進行・再発化学療法 ☐ 術後化学療法 ☐ 術前化学療法 ☐ 局所療法 ☐ その他	1クール期間	42日
診療科名	婦人科				実施回数	/回
登録医師名	山本 暖					
適用	がん化学療法後に増悪した切除不能な進行・再発の子宮体癌					

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	—	—	—	—	—	—	—	—	day42	
1	レンビマカプセル	20	mg	経口			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	連日投与
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
3	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン	30min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	最終濃度：1～10mg/mL以上 インラインフィルターを使用すること。
	ギイトルーダ点滴静注	400	mg														
4																	
5																	
6																	

備考欄
 プラチナ製剤を含む化学療法を行っていることを確認すること。
 レンパチニブとして1日1回20mgを連日経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。

減量・中止基準
 レンビマ添付文書参照

文献
 KEYNOTE-775/309試験