

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

| | | | | | | |
|--------|---------------------------|--|---|---|--------|-----------|
| レジメン名称 | 子宮体癌 AP (THP-ADM+CDDP) 療法 | | 臨床区分 | 抗癌剤適応分類 | 登録日 | 2012年8月4日 |
| 疾患名 | 子宮体癌 | | <input checked="" type="checkbox"/> 日常診療 <input type="checkbox"/> 単施設自主研究 <input type="checkbox"/> 他施設自主研究 <input type="checkbox"/> 市販後臨床研究 <input type="checkbox"/> 治験 | <input type="checkbox"/> 進行・再発化学療法 <input type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> 術前化学療法 <input type="checkbox"/> 局所療法 <input type="checkbox"/> その他 | 1クール期間 | 21~28日 |
| 診療科名 | 婦人科 | | | | 実施回数 | /回 |
| 登録医師名 | 早瀬 良二 | | | | | |

| Rp | 薬品名称 | 標準投与量 | 単位 | 投与方法 | ルート | 投与時間 | 投与日 | | | | | | | | | | 注意コメント |
|----|------------------|-------|-------|------|-----|--------|------|------|------|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------------|
| | | | | | | | day1 | day2 | day3 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1 | アブレヒタントカプセル125mg | 1 | Cap | 経口 | | | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 抗がん剤投与1~1時間30分前に内服 |
| 2 | アブレヒタントカプセル80mg | 1 | Cap | 経口 | | | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | 2日目以降、午前中内服 |
| 3 | 生理食塩液 | 100 | mL | 点滴静注 | メイン | | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること |
| 4 | 生理食塩液 | 100 | mL | 点滴静注 | 側管 | 15min | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | パロノセトロン静注0.75mg | 1 | 瓶 | | | | | | | | | | | | | | |
| | デキサート注射液 6.6mg | 1.5 | 瓶 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ソルデム3A輸液 | 500 | mL | 点滴静注 | 側管 | 60min | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 静注用マグネシウム | 0.5 | 管 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 20%マンニトールS注射液 | 300 | mL | 点滴静注 | 側管 | 30min | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | 5%糖液 | 100 | mL | 点滴静注 | 側管 | 全開 | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | ビナルビン注射用 | 30 | mg/m2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 生理食塩液 | 300 | mL | 点滴静注 | 側管 | 120min | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | ジスプラチン点滴静注 | 70~75 | mg/m2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ソルデム3A輸液 | 500 | mL | 点滴静注 | 側管 | 60min | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | ソルアセトD輸液 | 500 | mL | 点滴静注 | 側管 | 60min | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | ソルデム3A輸液 | 500 | mL | 点滴静注 | メイン | 60min | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | |
| | デキサート注射液 6.6mg | 1 | 瓶 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | ソルデム3A輸液 | 500 | mL | 点滴静注 | メイン | 60min | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | ソルアセトD輸液 | 500 | mL | 点滴静注 | メイン | 60min | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

備考欄

減量・中止基準

文献