

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	子宮体癌 Durvalumab+Olaparib維持療法		臨床区分 ☒ 日常診療 ☐ 単施設自主研究 ☐ 他施設自主研究 ☐ 市販後臨床研究 ☐ 治験	抗癌剤適応分類 ☒ 進行・再発化学療法 ☐ 術後化学療法 ☐ 術前化学療法 ☐ 局所療法 ☐ その他	登録日	2024年12月4日
疾患名	子宮体癌					
診療科名	婦人科					
登録医師名	藤田 志保					
適応	Durvalumab+タキサン+白金製剤併用療法後の維持療法				1クール期間	28日
					実施回数	/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1										
1	生理食塩液	100	mL	点滴静注			●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	インラインフィルターを使用すること。 最終濃度を1～15mg/mlとする。 体重30kg以下の場合は20mg/kgとする。 リムバーザが処方されているか確認すること
	イミフィンジ点滴静注	1500	mg/body														
3	リムバーザ	600	mg/body	経口			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
4																	

備考欄
※前治療にDurvalumab+タキサン+白金製剤併用療法を行っていることを確認すること
※ミスマッチ修復欠損なし(pMMR)の患者にのみ使用可能

減量・中止基準
イミフィンジは体重が30kg以下の場合は20mg/kgに減量すること
リムバーザの投与量は添付文書を参照すること

文献

Durvalumab Plus Carboplatin/Paclitaxel Followed by Maintenance Durvalumab With or Without Olaparib as First-Line Treatment for Advanced Endometrial Cancer: The Phase III DUO-E Trial