

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	子宮体癌 Durvalumab維持療法		臨床区分 <input checked="" type="checkbox"/> 日常診療 <input type="checkbox"/> 単施設自主研究 <input type="checkbox"/> 他施設自主研究 <input type="checkbox"/> 市販後臨床研究 <input type="checkbox"/> 治験	抗癌剤適応分類 <input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法 <input type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> 術前化学療法 <input type="checkbox"/> 局所療法 <input type="checkbox"/> その他	登録日	2024年12月4日
疾患名	子宮体癌					
診療科名	婦人科					
登録医師名	藤田 志保					
適応	Durvalumab+タキサン+白金製剤併用療法後の維持療法				1クール期間	28日
					実施回数	/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1										
1	生理食塩液	100	mL	点滴静注			●										血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン	60min	●										インラインフィルターを使用すること。 最終濃度を1～15mg/mlとする。 体重30kg以下の場合は20mg/kgとする。
	イミフィンジ点滴静注	1500	mg/body														
3																	
4																	

備考欄
※前治療にDurvalumab+タキサン+白金製剤併用療法を行っていることを確認すること
※ミスマッチ修復欠損あり(dMMR)の患者にのみ使用可能

減量・中止基準
イミフィンジは体重が30kg以下の場合は20mg/kgに減量すること

文献

Durvalumab Plus Carboplatin/Paclitaxel Followed by Maintenance Durvalumab With or Without Olaparib as First-Line Treatment for Advanced Endometrial Cancer: The Phase III DUO-E Trial