

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

| | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|--|---|---|--------|-----------|--|--|
| レジメン名称 | 子宮体癌 IA (IFM+THP-ADM) 療法 | | 臨床区分 | 抗癌剤適応分類 | 登録日 | 2012年8月4日 | | |
| 疾患名 | 子宮体癌 | | <input checked="" type="checkbox"/> 日常診療 <input type="checkbox"/> 単施設自主研究 <input type="checkbox"/> 他施設自主研究 <input type="checkbox"/> 市販後臨床研究 <input type="checkbox"/> 治験 | <input type="checkbox"/> 進行・再発化学療法 <input type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> 術前化学療法 <input type="checkbox"/> 局所療法 <input type="checkbox"/> その他 | 1クール期間 | 28日 | | |
| 診療科名 | 婦人科 | | | | | | | |
| 登録医師名 | 早瀬 良二 | | | | 実施回数 | /回 | | |

| Rp | 薬品名称 | 標準投与量 | 単位 | 投与方法 | ルート | 投与時間 | 投与日 | | | | | | | | | | 注意コメント |
|----|--------------------------------------|------------|--------------|------|-----|--------|------|------|------|------|------|---|---|---|---|---|------------------|
| | | | | | | | day1 | day2 | day3 | day4 | day5 | — | — | — | — | — | |
| 1 | 生理食塩液 | 500 | mL | 点滴静注 | メイン | 120min | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | グラニセトロン点滴静注液3mgパック テキサート注射液 6.6mg | 1 | 袋 瓶 | 点滴静注 | 側管 | 15min | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 5%糖液 ビノルピン注射用 | 100 30 | mL mg/m2 | 点滴静注 | 側管 | 全開 | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 生理食塩液 | 100 | mL | 点滴静注 | メイン | | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ルート洗浄用 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ウロミテキサン注 生理食塩液 | 400 20 | mg mL | 静注 | 側管 | 5min | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | イホマイド投与直前、以後4時間毎 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 生理食塩液 注射用イホマイド | 500 1.5 | mL g/body | 点滴静注 | 側管 | 120min | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ソルテム3A輸液 | 500 | mL | 点滴静注 | メイン | 120min | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ウロミテキサン注 生理食塩液 | 400 20 | mg mL | 静注 | 側管 | 5min | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | イホマイド投与直前、以後4時間毎 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ソルアセトD輸液 | 500 | mL | 点滴静注 | メイン | 120min | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ソルテム3A輸液 | 500 | mL | 点滴静注 | メイン | 120min | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | ウロミテキサン注 生理食塩液 | 400 20 | mg mL | 静注 | 側管 | 5min | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | イホマイド投与直前、以後4時間毎 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

備考欄

減量・中止基準

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| |
|--|

文献

| |
|--|
| |
|--|