

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	子宮体癌 TC (PTX+CBDCA) 療法		臨床区分 ☒ 日常診療 ☐ 単施設自主研究 ☐ 他施設自主研究 ☐ 市販後臨床研究 ☐ 治験	抗癌剤適応分類 ☐ 進行・再発化学療法 ☐ 術後化学療法 ☐ 術前化学療法 ☐ 局所療法 ☐ その他	登録日	2012年8月4日
疾患名	子宮体癌				(2023/3/2改訂)	
診療科名	婦人科				1クール期間	21日
登録医師名	早瀬 良二				実施回数	/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	アプレピタントカプセル125mg	1	Cap	経口			●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	抗がん剤開始1時間～1時間30分前に内服 day2～3のアプレピタントは別途処方 パクリタキセル投与開始30分前までに内服
	レスタミンコーワ錠 10mg	5	錠				●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	生理食塩液	250	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
	生理食塩液	100	mL				●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	デキサート注射液 6.6mg	3	瓶	点滴静注	側管	15min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	レスタミンと同時投与（レスタミン内服不可患者には医師に確認）
	ファモチジン注射液 20mg	1	管				●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	パロノセトロン静注0.75mg	1	瓶	点滴静注	側管	30min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	生理食塩液	100	mL				●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	生理食塩液	500	mL	点滴静注	側管	180min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	フィルター付き点滴セット使用
	パクリタキセル注	175～180	mg/m2				●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	生理食塩液	250	mL	点滴静注	側管	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	最大800mgまで
	カルボプラチン点滴静注液	5～6	AUC				●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7																	

備考欄

減量・中止基準

文献