

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	子宮体癌 Tweekly (PTX) 療法		臨床区分 ☒ 日常診療 ☐ 単施設自主研究 ☐ 他施設自主研究 ☐ 市販後臨床研究 ☐ 治験	抗癌剤適応分類 ☐ 進行・再発化学療法 ☐ 術後化学療法 ☐ 術前化学療法 ☐ 局所療法 ☐ その他	登録日	2012年8月4日
疾患名	子宮体癌	1クール期間			28日	
診療科名	婦人科					
登録医師名	早瀬 良二					
					実施回数	/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日								注意コメント		
							day1	—	day8	—	day15	—	day22	—		—	—
1	レスタミンコーワ錠 10mg	3	錠	経口			●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	パクリタキセル投与開始30分前までに内
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを 装着すること
3	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	15min	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	レスタミンと同時投与（レスタミン内服 不可患者には医師に確認）
	デキサード注射液 6.6mg	1	瓶														
	ファモチジン注射液 20mg	1	管														
4	グラニセトロン点滴静注液3mgバック	1	袋	点滴静注	側管	30min	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	
5	生理食塩液	250	mL	点滴静注	側管	60min	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	フィルター付き点滴セット使用
	パクリタキセル注	60	mg/m2														
6																	

備考欄

減量・中止基準

文献