

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	子宮体癌 Weekly C (PTX+CBDCA) 療法						臨床区分	抗癌剤適応分類						登録日	2012年8月4日				
疾患名	子宮体癌			<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療 <input type="checkbox"/> 単施設自主研究 <input type="checkbox"/> 他施設自主研究 <input type="checkbox"/> 市販後臨床研究 <input type="checkbox"/> 治験						<input type="checkbox"/> 進行・再発化学療法 <input type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> 術前化学療法 <input type="checkbox"/> 局所療法 <input type="checkbox"/> その他						(2023/3/2改訂)			
診療科名	婦人科															1クール期間	28日		
登録医師名	早瀬 良二															実施回数	/回		
Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日								注意コメント				
							day1	—	—	day8	—	—	day15	—					—
1	アプレビタントカプセル125mg	1	Cap	経口			●	—	—	—	—	—	—	—	抗がん剤開始1時間～1時間30分前に内服 day2～3のアプレビタントは別途処方				
2	レスタミンコーワ錠 10mg	3	錠							●	—	—	●	—	—	●	—	パクリタキセル投与開始30分前に内服	
3	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	●	—	—	●	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること				
4	生理食塩液 デキサート注射液 6.6mg ファモチジン注射液 20mg	100 1.5 1	mL 瓶 管				点滴静注	側管	15min	●	—	—	●	—	—	●	—	レスタミンと同時投与（レスタミン内服不可患者には医師に確認）	
5	パロノセトロン静注用0.75mg	1	瓶	点滴静注	側管	30min	●	—	—	—	—	—	—	—					
6	生理食塩液	100	mL							●	—	—	—	—	—	—	—		
7	グラニセトロン点滴静注液1mg/バック 生理食塩液 パクリタキセル注	1 250 60	袋 mL mg/m2	点滴静注	側管	30min	—	—	—	●	—	—	●	—					
8	カルボプラチナ点滴静注液	5~6	AUC							—	—	—	—	—	—	—	最大投与量：800mgまで		

備考欄

減量・中止基準

文献