

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	卵巣癌 【7日間、PTX 80mg/m ² 】、TCweekly療法		臨床区分	抗癌剤適応分類	登録日	2017年11月1日	
疾患名	卵巣癌		<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療 <input type="checkbox"/> 単施設自主研究 <input type="checkbox"/> 他施設自主研究 <input type="checkbox"/> 市販後臨床研究 <input type="checkbox"/> 治験	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法 <input type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> 術前化学療法 <input type="checkbox"/> 局所療法 <input type="checkbox"/> その他	1クール期間	7日	
診療科名	婦人科				実施回数	/回	
登録医師名	山本 暖						

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	レスタミンコーワ錠 10mg	3	錠	経口			●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	パクリタキセル投与開始30分前までに内
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを 装着すること
3	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	15min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	レスタミンと同時投与（レスタミン内服 不可患者には医師に確認）
	デキサート注射液 6.6mg	1.5	瓶														
	ファモチジン注射液 20mg	1	管														
4	グラニセトン点滴静注液3mgバック	1	袋	点滴静注	側管	30min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	生理食塩液	250	mL	点滴静注	側管	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	フィルター付き点滴セット使用
	パクリタキセル注	80	mg/m ²														
6	生理食塩液	250	mL	点滴静注	側管	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	カルボプラチン点滴静注液	2	AUC														
7																	

備考欄

減量・中止基準

好中球数1000/ μ L以下
 血小板数7.5万/ μ L以下

文献

Weekly carboplatin and paclitaxel is safe, active, and well tolerated in recurrent ovarian cancer cases of Japanese women previously treated with cisplatin-containing multidrug chemotherapy