

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	卵巣癌 dd-TC (PTX+CBDCA) 療法		臨床区分 ☒ 日常診療 ☐ 単施設自主研究 ☐ 他施設自主研究 ☐ 市販後臨床研究 ☐ 治験	抗癌剤適応分類 ☒ 進行・再発化学療法 ☐ 術後化学療法 ☐ 術前化学療法 ☐ 局所療法 ☐ その他	登録日	2014年2月6日
疾患名	卵巣癌				(2023/3/2改訂)	
診療科名	婦人科				1クール期間	21日
登録医師名	早瀬 良二				実施回数	6～9/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日									注意コメント
							day1	—	—	day8	—	—	day15	—	—	
1	アプレピタントカプセル125mg	1	Cap	経口			●	—	—	—	—	—	—	—	—	抗がん剤開始1時間～1時間30分前に内服 day2～3のアプレピタントは別途処方 パクリタキセル投与開始30分前までに内服
2	レスタミンコーワ錠 10mg	5	錠	経口			●	—	—	●	—	—	●	—	—	
3	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	●	—	—	●	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
4	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	15min	●	—	—	●	—	—	●	—	—	レスタミンと同時投与（レスタミン内服不可患者には医師に確認）
	デキサート注射液 6.6mg	1.5	瓶													
	ファモチジン注射液 20mg	1	管													
5	パロノセトロン静注用0.75mg	1	瓶	点滴静注	側管	30min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	
	生理食塩液	100	mL													
6	グラニセトロン点滴静注液1mgバック	1	袋	点滴静注	側管	30min	—	—	—	●	—	—	●	—	—	
																フィルター付き点滴セット使用
7	生理食塩液	250	mL	点滴静注	側管	60min	●	—	—	●	—	—	●	—	—	
	パクリタキセル注	80	mg/m2													
8	生理食塩液	250	mL	点滴静注	側管	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	
	カルボプラチン点滴静注液	6	AUC													

備考欄

減量・中止基準

文献

Dose-dense paclitaxel once a week in combination with carboplatin every 3 weeks for advanced ovarian cancer:a phase 3,open-