

## 国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	<b>卵巣癌 DTX+BEV療法</b>							登録日	2014年3月6日							
疾患名	卵巣癌		臨床区分			抗癌剤適応分類			1クール期間	21日						
診療科名	婦人科		<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療 <input type="checkbox"/> 単施設自主研究 <input type="checkbox"/> 他施設自主研究 <input type="checkbox"/> 市販後臨床研究 <input type="checkbox"/> 治験			<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法 <input type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> 術前化学療法 <input type="checkbox"/> 局所療法 <input type="checkbox"/> その他			実施回数	/回						
登録医師名	早瀬 良二															
Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日								注意コメント	
							day1	—	—	day8	—	—	—	—		—
1	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	●	—	—	—	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
	グラニセトロン点滴静注液3mgパック	1	袋													
	テキサート注射液 6.6mg	1	瓶													
2	生理食塩液	250	mL	点滴静注	側管	30min	●	—	—	●	—	—	—	—	—	
	ドセタキセル点滴静注液	40	mg/m <sup>2</sup>													
3	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	60min	●	—	—	●	—	—	—	—	—	
	ヘバジスマブ点滴静注用	15	mg/kg													
4	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	90min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	初回90min、初回の忍容性が良好であれば2回目60min、2回目の忍容性が良好であれば3回目以降30min
	ヘバジスマブ点滴静注用	15	mg/kg													
5																

## 備考欄

## 減量・中止基準

## 文献

A phase II trial of docetaxel and bevacizumab in recurrent ovarian cancer within 12 months of prior platinum-based chemotherapy