

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	卵巣癌 GC (GEM+CBDCA) +BEV療法						臨床区分	抗癌剤適応分類						登録日	2014年1月9日			
疾患名	卵巣癌									<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法					(2023/3/2改訂)		
診療科名	婦人科									<input type="checkbox"/> 単施設自主研究	<input type="checkbox"/> 術後化学療法	<input type="checkbox"/> 術前化学療法	<input type="checkbox"/> 局所療法	<input type="checkbox"/> その他				
登録医師名	早瀬 良二			<input type="checkbox"/> 他施設自主研究	<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究	<input type="checkbox"/> 治験	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1クール期間	21日			
														実施回数	6/回			
Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日								注意コメント			
							day1	—	—	day8	—	—	—	—				
1	アプレビタントカプセル125mg	1	Cap	経口			●	—	—	—	—	—	—	—	—	抗がん剤開始1時間～1時間30分前に内服 day2～3のアプレビタントは別途処方		
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	●	—	—	—	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること		
3	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	15min	●	—	—	—	—	—	—	—	—			
	ハロノセトロン静注用0.75mg デキサミド注射液 6.6mg	1 1.5	管 管															
4	グラニセトロン点滴静注液1mgパック	1	袋	点滴静注	側管	15min	—	—	—	●	—	—	—	—	—			
	デキサート注射液 6.6mg	1	瓶															
5	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	30min	●	—	—	●	—	—	—	—	—			
	ゲムジタピン点滴静注用	800～1000	mg/m ²															
6	生理食塩液	250	mL	点滴静注	側管	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—			
	ガルボプラチン点滴静注液	4	AUC															
7	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	90min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	初回90min、初回の忍容性が良好であれば2回目60min、2回目の忍容性が良好であれば3回目以降30min		
	ベバシズマブ点滴静注用	15	mg/kg															

備考欄

減量・中止基準

文献

OCEANS : A Randomized,Double-Blind,Placedo-Controlled Phase III Trial of Chemotherapy With or Without Bevacizumab in Patients With