

## 国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	卵巣癌 GEM+BEV療法							登録日	2015年10月20日				
疾患名	卵巣癌		臨床区分		抗癌剤適応分類		1クール期間	21日					
診療科名	婦人科		<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療 <input type="checkbox"/> 単施設自主研究 <input type="checkbox"/> 他施設自主研究 <input type="checkbox"/> 市販後臨床研究 <input type="checkbox"/> 治験		<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法 <input type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> 術前化学療法 <input type="checkbox"/> 局所療法 <input type="checkbox"/> その他		実施回数	/回					
Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日					注意コメント	
1	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		day1	—	—	day8	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを 装着すること
							●	—	—	●	—	—	—
2	グラニセトロン点滴静注液3mgパック	1	袋	点滴静注	側管	30min	●	—	—	●	—	—	
	テキサート注射液 6.6mg	1	瓶				●	—	—	●	—	—	—
3	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	30min	●	—	—	●	—	—	
	ゲムジタピン点滴静注用	1000	mg/m2				●	—	—	●	—	—	—
4	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	90min	●	—	—	—	—	—	初回90min、忍容が確認できれば、2回 目60min、3回目以降 30minに変更 可
	ヘバジスマブ点滴静注用	15	mg/kg				●	—	—	—	—	—	—
5													

## 備考欄

## 減量・中止基準

## 文献

The Efficacy and Toxicity of Bevacizumab in Combination With Gemcitabine in Patients With Recurrent Ovarian Cancer