

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	卵巣癌 TC (PTX+CBDCA) +BEV療法		臨床区分 <input checked="" type="checkbox"/> 日常診療 <input type="checkbox"/> 単施設自主研究 <input type="checkbox"/> 他施設自主研究 <input type="checkbox"/> 市販後臨床研究 <input type="checkbox"/> 治験	抗癌剤適応分類 <input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法 <input type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> 術前化学療法 <input type="checkbox"/> 局所療法 <input checked="" type="checkbox"/> その他	登録日	2023年3月1日		
疾患名	卵巣癌				1クール期間	21日		
診療科名	婦人科					実施回数	/回	
登録医師名	今福 紀章							
適応	進行又は再発の卵巣癌							

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	アブレヒタントカプセル125mg	1	Cap	経口			●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	抗がん剤開始1時間～1時間30分前に内服 day2～3のアブレヒタントは別途処方 パクリタキセル投与開始30分前までに内服
	レスタミンコーワ錠 10mg	5	錠				●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	生理食塩液	250	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
	生理食塩液	100	mL				●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	デキサート注射液 6.6mg	3	瓶	点滴静注	側管	15min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	レスタミンと同時投与（レスタミン内服不可患者には医師に確認）
	ブアモチジン注射液 20mg	1	瓶				●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	パロノセトロン静注用0.75mg	1	瓶	点滴静注	側管	30min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	生理食塩液	100	mL				●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	生理食塩液	500	mL	点滴静注	側管	180min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	フィルター付き点滴セット使用
	パクリタキセル注	175	mg/m2				●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	生理食塩液	250	mL	点滴静注	側管	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	最大投与量：800mgまで
	カルボプラチン点滴静注液	6	AUC				●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	90min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	初回90min、初回の忍容性が良好であれば2回目60min、2回目の忍容性が良好であれば3回目以降30min
	ペバシズマブ点滴静注用	15	mg/kg				●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

備考欄

減量・中止基準

文献

NCCN Guidelines Ver.4 2019 子宮頸癌