

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	卵巣癌 TC (PTX+CBDCA) 療法						臨床区分	抗癌剤適応分類						登録日	2012年8月4日				
疾患名	卵巣癌								<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療	<input type="checkbox"/> 進行・再発化学療法						(2023/3/2改訂)			
診療科名	婦人科								<input type="checkbox"/> 単施設自主研究	<input type="checkbox"/> 術後化学療法						1クール期間	21日		
登録医師名	早瀬 良二								<input type="checkbox"/> 他施設自主研究	<input type="checkbox"/> 術前化学療法						実施回数	/回		
<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究							<input type="checkbox"/> 局所療法	<input type="checkbox"/> その他											
<input type="checkbox"/> 治験																			
Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント		
							day1	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
1	アプレビタントカプセル125mg	1	Cap	経口			●	—	—	—	—	—	—	—	—	抗がん剤開始1時間～1時間30分前に内服 day2～3のアプレビタントは別途処方			
2	レスタミンコーワ錠 10mg	5	錠				●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	パクリタキセル投与開始30分前に内	
3	生理食塩液	250	mL				点滴静注	メイン		●	—	—	—	—	—	—	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
4	生理食塩液 デキサート注射液 6.6mg ファモチジン注射液 20mg	100 3 1	mL 瓶 管	点滴静注	側管	15min	●			—	—	—	—	—	—	—	—	レスタミンと同時投与（レスタミン内服不可患者には医師に確認）	
5	パロノセトロン静注用0.75mg	1	瓶	点滴静注	側管	30min	●	—	—	—	—	—	—	—	—				
6	生理食塩液 パクリタキセル注	100 175～180 mg/m2	mL mg/m2	点滴静注			側管	180min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	フィルター付き点滴セット使用	
7	生理食塩液 ガルボプラチン点滴静注液	250 5～6	mL AUC	点滴静注	側管	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	最大投与量：800mgまで			

備考欄

減量・中止基準

文献