

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	卵巣癌 Topotecan (ハイカム) +BEV療法						臨床区分	抗癌剤適応分類						登録日	2015年10月20日				
疾患名	卵巣癌									<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法						1クール期間	21日	
診療科名	婦人科									<input type="checkbox"/> 単施設自主研究	<input type="checkbox"/> 術後化学療法	<input type="checkbox"/> 術前化学療法	<input type="checkbox"/> 局所療法	<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 他施設自主研究	<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究			
登録医師名	澤田 麻里															実施回数	/回		
Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント		
							day1	day2	day3	day4	day5	—	—	—	—	—		—	
1	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	●	●	●	●	—	—	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを 装着すること			
	生理食塩液	100	mL				●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—		
	テキサート注射液 6.6mg	1	瓶																
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	15min	●	●	●	●	●	—	—	—	—				
	ハイカムチン注射用	1.25	mg/m ²				●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—		
3	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	30min	●	●	●	●	●	—	—	—	—				
	ヘバジスマブ点滴静注用	15	mg/kg				●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
4	生理食塩液	100	mL	静注	側管	90min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	初回90min、初回の忍容性が良好であれば2回目60min、2回目の忍容性が良好であれば3回目以降30min			
	ヘバジスマブ点滴静注用	15	mg/kg																
5																			

備考欄

減量・中止基準

文献

Bevacizimab Combined With Chemotherapy for Platinum Resistant Recurrent Ovarian Cancer : The AURELIA Open Label Randomized Phase III Trial