

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	卵巣癌 TP (PTX+CDDP) 療法	臨床区分	抗癌剤適応分類	登録日	2012年8月4日
疾患名	卵巣癌	<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療	<input type="checkbox"/> 進行・再発化学療法	1クール期間	21日
診療科名	婦人科	<input type="checkbox"/> 単施設自主研究	<input type="checkbox"/> 術後化学療法	実施回数	/回
登録医師名	早瀬 良二	<input type="checkbox"/> 他施設自主研究	<input type="checkbox"/> 術前化学療法		
		<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究	<input type="checkbox"/> 局所療法		
		<input type="checkbox"/> 治験	<input type="checkbox"/> その他		

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	day2	day3	—	—	—	—	—	—	—	
1	アフレピタントカプセル125mg	1	錠	経口			●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	抗がん剤投与1時間～1時間30分前に内服
2	アフレピタントカプセル80mg	1	錠	経口			—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	2日目以降、午前中内服
3	レスタミンコーワ錠 10mg	5	錠	経口			●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	パクリタキセル投与開始30分前まで内服
4	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
5	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	15min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	レスタミンと同時投与（レスタミン内服不可患者には医師に確認）
6	テキサート注射液 6.6mg ファモチジン注射液 20mg	3	瓶	点滴静注	側管	30min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	180min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	八百ノセトロン静注0.75mg ソリルテム3A輸液 静注用マグネソール	1	瓶	点滴静注	側管	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	ソリルテム3A輸液 20%マンニットールS注射液	500	mL	点滴静注	側管	30min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	ソリルテム3A輸液 生理食塩液 シスプラチン点滴静注 70 mg/m2	300	mL	点滴静注	側管	120min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	ソリルテム3A輸液 生理食塩液	500	mL	点滴静注	側管	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	ソリルテム3A輸液 ソリアセトD輸液	500	mL	点滴静注	側管	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	ソリルテム3A輸液 テキサート注射液 6.6mg	500	mL	点滴静注	メイン	60min	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	
14	ソリルテム3A輸液 ソリルテム3A輸液	500	mL	点滴静注	メイン	60min	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	
15	ソリルテム3A輸液 ソリアセトD輸液	500	mL	点滴静注	メイン	60min	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	

備考欄

減量・中止基準

文献