

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	绒毛癌 EP/EMA療法		臨床区分	抗癌剤適応分類	登録日	2014年2月6日
疾患名	绒毛癌			<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療	※2022/10/6改訂	
診療科名	婦人科			<input type="checkbox"/> 単施設自主研究	1クール期間	
登録医師名	山本 暖			<input type="checkbox"/> 他施設自主研究	14日	
				<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究	実施回数	
				<input type="checkbox"/> 治験	/回	

R#	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	day2	day3	-	-	-	day8	day9	day10	-	
1	ソルテム3A輸液	500	mL	点滴静注	メイン	60min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※開始から終了までECGモニターを 義務すること
2	アフレピタントカプセル125mg	1	Cap	経口			●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	抗癌剤投与1～1時間30分前に内服
3	アフレピタントカプセル80mg	1	Cap	経口			-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	2日目以降、午前中内服
4	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン	30min	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	
	八ロフセトロン静注0.75mg	1	瓶														
	チキサート注射液 6.6mg	1.5	瓶														
5	ソリアセトD輸液	500	mL	静注用マグネツール	0.5	管	点滴静注	メイン	60min	●	-	-	-	-	-	-	
6	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	血管確保用
7	生理食塩液	500	mL	エトボシド点滴静注液	150	mg/m2	点滴静注	メイン	60min	●	-	-	-	-	-	-	
8	20%マンニットール25注射液	300	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	生理食塩液	2000	mL	シスプラチニン注	75	mg/m2	点滴静注	メイン	12h	●	-	-	-	-	-	-	遮光 全量2000mLに調製する
10	ソルテム3A輸液	500	mL	チキサート注射液 6.6mg	1	瓶	点滴静注	メイン	60min	-	●	●	-	-	-	-	
11	ソルテム3A輸液	500	mL	点滴静注	メイン		点滴静注	メイン	60min	●	●	●	-	-	-	-	
12	ソリアセトD輸液	500	mL	点滴静注	メイン		点滴静注	メイン	60min	●	●	●	-	-	-	-	
13	生理食塩液	500	mL	エトボシド点滴静注液	100	mg/m2	点滴静注	メイン	60min	-	-	-	-	-	●	-	
14	コスマグエン静注用	0.5	mg/body	注射用水			点滴静注	メイン	全開	-	-	-	-	-	●	-	コスマグエン静注用1Vにつき注射用水 1.1mLで溶解する。
15	生理食塩液	50	mL	生理食塩液	1000	mL	点滴静注	メイン	12h	-	-	-	-	-	●	-	
	注射用メソトリレキセート	300	mg/m2	注射用メソトリレキセート	300	mg/m2	点滴静注	メイン		-	-	-	-	-	●	-	
16	ロイコボリン注	15	mg	筋注						-	-	-	-	-	●	●	メソトリレキセート投与開始後24時間後 から12時間毎に投与
17	ロイコボリン注	15	mg	筋注						-	-	-	-	-	●	●	メソトリレキセート投与開始後24時間後 から12時間毎に投与
18																	

備考欄

文献

減量・中止基準

--

文献

Etoposide and Cisplatin/Etoposide,Methotrexate, and Actinomycin(EMA) Chemotherapy for Patients With High-Risk Gestational Trophoblastic Tumors Refractory to EMD/Cyclophosphamide and Vincristine Chemotherapy and Patients Presenting With Metastatic Placental Site Trophoblastic Tumors