

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	絨毛癌 FA (5-FU+ACT-D) 療法						登録日	2013年12月7日										
疾患名	絨毛癌		臨床区分			抗癌剤適応分類			1クール期間	14~21日								
診療科名	婦人科		<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療 <input type="checkbox"/> 単施設自主研究 <input type="checkbox"/> 他施設自主研究 <input type="checkbox"/> 市販後臨床研究 <input type="checkbox"/> 治験			<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法 <input type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> 術前化学療法 <input type="checkbox"/> 局所療法 <input type="checkbox"/> その他			実施回数	/回								
登録医師名	山本 暖																	
Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント	
							day1	day2	day3	day4	day5	—	—	—	—	—		—
1	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	●	●	●	●	—	—	—	—	血管確保用		
	グラニセトロン点滴静注液3mg/バック	1	袋				●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	
	テキサート注射液 6.6mg	1	瓶				●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—
4	コスメゲン静注用 注射用水	0.5	mg/body	点滴静注	メイン	全開	●	●	●	●	●	—	—	—	—	コスメゲン静注用1Vにつき注射用水 1.1mLで溶解する。		
	生理食塩液	50	mL				●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	
	ソルテム3A輸液	1000	mL				●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—
5	フルオロワラシル点滴静注	1500	mg/body	点滴静注	メイン	8H	●	●	●	●	●	—	—	—	—			
							●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	
							●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—
6																		

備考欄

減量・中止基準

文献

Salvage Combination Chemotherapy with 5-Fluorouracil and
Actinomycin D for Patients with Refractory, High-Risk Gestational
Trophoblastic Tumors