

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	胚細胞腫瘍 BEP療法		臨床区分	抗癌剤適応分類	登録日	2012年8月4日
疾患名	胚細胞腫瘍		<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療 <input type="checkbox"/> 単施設自主研究 <input type="checkbox"/> 他施設自主研究 <input type="checkbox"/> 市販後臨床研究 <input type="checkbox"/> 治験		<input type="checkbox"/> 進行・再発化学療法 <input type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> 術前化学療法 <input type="checkbox"/> 局所療法 <input type="checkbox"/> その他	
診療科名	婦人科				※改訂	2025/8/8
登録医師名	早瀬 良二				1クール期間	21日
					実施回数	/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	day2	day3	day4	day5	—	—	day9	day16	—	
1	アフレピタントカプセル125mg	1	Cap	経口			●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	抗がん剤投与1~1時間30分前に内服
2	アフレピタントカプセル80mg	1	Cap	経口			—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	2日目以降、午前中内服
3	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
4	グラニセトロン点滴静注液3mg/バック テキサート注射液 6.6mg	1 1.5	袋 瓶	点滴静注	側管	15min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	グラニセトロン点滴静注液3mg/バック テキサート注射液 6.6mg	1	袋	点滴静注	側管	15min	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	
6	生理食塩液 ブレオ注射用	100 30	mL mg	点滴静注	側管	30min	—	●	—	—	—	—	—	●	●	—	
7	生理食塩液 エトボシド点滴静注液	500 100	mL mg/m2	点滴静注	側管	60min	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	
8	生理食塩液 ジスプラチジン注	500 20	mL mg/m2	点滴静注	側管	60min	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	
9	ソルアセトF輸液	500	mL	点滴静注	側管	60min	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	
10																	

備考欄

※婦人科のコンセンサスを得てブレオの溶解液を20mL→100mLへ、手技を静注→点滴静注へ変更(2025/8/8)

減量・中止基準

--

文献

--