

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	乳癌 Pembrolizumab+GEM+CBDCA療法		臨床区分	抗癌剤適応分類	登録日	2021年10月6日	
疾患名	切除不能・再発乳癌		<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療 <input type="checkbox"/> 単施設自主研究 <input type="checkbox"/> 他施設自主研究 <input type="checkbox"/> 市販後臨床研究 <input type="checkbox"/> 治験	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法 <input type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> 術前化学療法 <input type="checkbox"/> 局所療法 <input type="checkbox"/> その他	1クール期間	21日	
診療科名	乳腺・甲状腺外科				実施回数	/回	
登録医師名	三好 和也						
適応	PD-L1陽性の切除不能、再発トリプルネガティブ乳癌						

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	—	—	day8	—	—	day15	—	—	day21	
1	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	血管確保用 ※開始時から終了までECGモニターを装着すること。
2	グラニセトロン点滴静注液3mgバック デキサート注射液 6.6mg	1 1.5	袋 瓶	点滴静注	側管	30min	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	
3	生理食塩液	50	mL	点滴静注	側管		●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	キイトルーダ前後ルート洗浄用
4	キイトルーダ点滴静注 生理食塩液	200 100	mg mL	点滴静注	側管	30min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	最終濃度：1～10mg/mL以上 インラインフィルターを使用すること キイトルーダ投与前後生食でフラッシュ
5	ゲムシタピン点滴静注用 生理食塩液	1000 100	mg/m2 mL	点滴静注	側管	30min	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	
6	カルボプラチン点滴静注液 生理食塩液	2 250	AUC mL	点滴静注	側管	60min	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	

備考欄

※キイトルーダはフィルターを使用する。

減量・中止基準

文献

KEYNOTE-355試験