

## 国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	乳癌 Pembrolizumab+nabPTX療法				臨床区分		抗癌剤適応分類		登録日	2025年10月8日									
疾患名	乳癌						<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療 <input type="checkbox"/> 単施設自主研究 <input type="checkbox"/> 他施設自主研究 <input type="checkbox"/> 市販後臨床研究 <input type="checkbox"/> 治験		1クール期間	84日									
診療科名	乳腺・内分泌外科						高橋 寛敏					実施回数	/回						
登録医師名																			
適応	PD-L1陽性の転移・再発トリプルネガティブ乳癌																		
Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント		
							day1	day8	day15	day22	day29	day36	day43	day50	day57	day64		day71	day78
1	生理食塩液	250	mL	点滴静注	メイン		●	●	●	—	●	●	●	—	●	●	●	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを 装着すること
	キイトルーダ点滴静注	400	mg				100	mL	点滴静注	側管	30min	●	—	—	—	—	●	—	—
2	生理食塩液	50	mL	点滴静注	側管		●						●	—	—	—	—	—	キイトルーダ後フラッシュ
	グラニセトロン点滴静注液1mg/バック	1	袋				テキサート注射液 6.6mg	1	瓶	点滴静注	側管	30min	●	●	●	—	●	●	●
3	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	30min	●						●	—	—	—	—	—	各バイアル生食20mLで溶解し、使用量 のみ空容器に注入 ※生食のみ配合可能 ※インラインフィルターを使用しないこと。 ※特定生物由来製品であるため、ロット 番号入力を忘れないこと。 ※特定生物由来製品であるため、同意書 が必要
	アフラキサン点滴静注用	100	mg/m2				点滴静注	側管	30min	●	●	●	—	●	●	●	—	●	●
4	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	30min	●	●	●	—	●	●	●	—	●	●	●	—	
	アフラキサン点滴静注用	100	mg/m2				点滴静注	側管	30min	●	●	●	—	●	●	●	—	●	●
5	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	30min	●	●	●	—	●	●	●	—	●	●	●	—	
	アフラキサン点滴静注用	100	mg/m2				点滴静注	側管	30min	●	●	●	—	●	●	●	—	●	●

## 備考欄

## 文献

Pembrolizumab plus chemotherapy versus placebo plus chemotherapy for previously untreated locally recurrent inoperable or mretastatic triple-negative breast cancer (KEYNOTE-355): a randomised, placebo-controlled, double-blind, phase 3 clinical trial

## 減量・中止基準

nabPTX  
 1段階減量：～20%減量  
 2段階減量：～20%減量（計40%減量）  
 3段階減量：中止