

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	乳癌 2週毎 PTX療法						臨床区分	抗癌剤適応分類						登録日	2012年12月1日		
疾患名	乳癌						<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療	<input type="checkbox"/> 単施設自主研究	<input type="checkbox"/> 他施設自主研究	<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究	<input type="checkbox"/> 治験	<input type="checkbox"/> 進行・再発化学療法	<input type="checkbox"/> 術後化学療法	<input type="checkbox"/> 術前化学療法	<input type="checkbox"/> 局所療法	<input type="checkbox"/> その他	
診療科名	乳腺・甲状腺外科												1クール期間	14日			
登録医師名	野村 長久												実施回数	/回			
Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	レスタミンコーワ錠 10mg	5	錠	経口			●	—	—	—	—	—	—	—	—	バクリタキセル投与開始30分前までに内	
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	—	—	—	—	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを 装着すること	
3	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	15min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	レスタミンと同時投与（レスタミン内服 不可患者には医師に確認）	
	テキサート注射液 6.6mg	3	瓶														
4	ファモチジン注射液 20mg	1	管	点滴静注	側管	30min	●	—	—	—	—	—	—	—	—		
	グラニセトロン点滴静注液3mgパック	1	袋														
5	5%糖液	250	mL	点滴静注	側管	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	フィルター付き点滴セット使用	
	バクリタキセル注	80~140	mg/m ²														
6																	

備考欄

減量・中止基準

文献