

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	乳癌 3週毎 PTX療法						臨床区分	抗癌剤適応分類						登録日	2012年12月1日							
疾患名	乳癌									<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療	<input type="checkbox"/> 進行・再発化学療法					1クール期間	21日					
診療科名	乳腺・甲状腺外科									<input type="checkbox"/> 単施設自主研究	<input type="checkbox"/> 術後化学療法											
登録医師名	野村 長久			<input type="checkbox"/> 他施設自主研究	<input type="checkbox"/> 術前化学療法					<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究	<input type="checkbox"/> 局所療法											
				<input type="checkbox"/> 治験	<input type="checkbox"/> その他										実施回数	/回						
Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント					
							day1	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—
1	レスタミンコーワ錠 10mg	5	錠	経口			●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	パクリタキセル投与開始30分前までに内					
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること					
3	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	15min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	レスタミンと同時投与（レスタミン内服不可患者には医師に確認）					
	テキサート注射液 6.6mg	3	瓶																			
	ファモチジン注射液 20mg	1	管																			
4	グラニセトロン点滴静注液3mg/バック	1	袋	点滴静注	側管	30min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
5	5%糖液	500	mL	点滴静注	側管	180min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	フィルター付き点滴セット使用 パクリタキセル濃度（0.3～1.2mg/mL）になるように調製（液量					
	パクリタキセル注	175～210	mg/m ²																			
6																						

備考欄

減量・中止基準

文献