

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	乳癌 EC75療法						臨床区分	抗癌剤適応分類						登録日	2012年12月1日				
疾患名	乳癌									<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療	<input type="checkbox"/> 進行・再発化学療法					1クール期間	21日		
診療科名	乳腺・甲状腺外科									<input type="checkbox"/> 単施設自主研究	<input type="checkbox"/> 術後化学療法	<input type="checkbox"/> 術前化学療法	<input type="checkbox"/> 局所療法	<input type="checkbox"/> その他					
登録医師名	野村 長久			<input type="checkbox"/> 他施設自主研究	<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究	<input type="checkbox"/> 治験	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	実施回数	/回				
Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント		
1	生理食塩液	250	mL	点滴静注	メイン		day1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	血管確保用	
							●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
2	グラニセトロン点滴静注液3mgパック	1	袋	点滴静注	側管	30min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	テキサート注射液 6.6mg	2	瓶				●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
3	生理食塩液	50	mL	点滴静注	側管	全開	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	エビルビシン塩酸塩注射用	75	mg/m ²				●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
4	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※エビルビシン後のルート洗浄用	
							●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
5	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	30min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	注射用エンドキサン	600	mg/m ²				●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
6																			

備考欄

2~4日目 テカドロン錠4mg 2T/日 内服

減量・中止基準

【EPI：肝機能低下症例に対する減量の目安】

T-Bil : 1.2~3.0かつAST 2~4×ULN → EPI : 50%減量

T-Bil : 3.1~5.0かつAST>4×ULN → EPI : 75%減量

【CPA：腎障害時の減量基準】

GFR<10 → 25%減量

【CPA：肝障害時の減量基準】

T-Bil 3.1~5.0 mg/dL or AST>3×ULN → 25%減量

T-BIL>5.0 mg/dL → 中止

参考：がん化学療法レジメンハンドブック第7版 p266

文献