

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	乳癌 EC100療法 (APR+Palo)						登録日	2012年12月1日										
疾患名	乳癌		臨床区分				抗癌剤適応分類											
診療科名	乳腺・甲状腺外科		<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療 <input type="checkbox"/> 単施設自主研究 <input type="checkbox"/> 他施設自主研究 <input type="checkbox"/> 市販後臨床研究 <input type="checkbox"/> 治験				<input type="checkbox"/> 進行・再発化学療法 <input checked="" type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> 術前化学療法 <input type="checkbox"/> 局所療法 <input type="checkbox"/> その他	1クール期間	21日									
登録医師名	野村 長久						実施回数	/回										
Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日								注意コメント			
							day1	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—
1	アフレビタントカプセル125mg	1	Cap	経口			●	—	—	—	—	—	—	—	抗がん剤投与1時間～1時間30分前に内服			
2	生理食塩液	250	mL				点滴静注	メイン		●	—	—	—	—	—	—	—	血管確保用
3	生理食塩液 ハロノセトロン静注用0.75mg デキサート注射液6.6mg	100 1 1.5	mL 瓶 瓶				点滴静注	側管	15min	●	—	—	—	—	—	—	—	
4	生理食塩液 エビルビシン塩酸塩注射用	50 100	mL mg/m2	点滴静注	側管	全開	●	—	—	—	—	—	—	—				
5	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	—	—	—	—	—	※エビルビシン後のルート洗浄用			
6	生理食塩液 注射用エンドキサン	100 600	mL mg/m2				点滴静注	側管	30min	●	—	—	—	—	—	—	—	

備考欄

2~3日目 アフレビタントカプセル80mg 1日1回 内服
2~4日目 デカドロン錠4mg 2T/日 内服

文献

減量・中止基準

【EPI：肝機能低下症例に対する減量の目安】
 T-Bil : 1.2~3.0かつAST 2~4×ULN → EPI : 50%減量
 T-Bil : 3.1~5.0かつAST>4×ULN → EPI : 75%減量
 【CPA：腎障害時の減量基準】
 GFR<10 → 25%減量
 【CPA：肝障害時の減量基準】
 T-Bil 3.1~5.0 mg/dL or AST>3×ULN → 25%減量
 T-BIL>5.0 mg/dL → 中止

参考：がん化学療法レジメンハンドブック第7版 p266