

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	乳癌 GT (GEM+PTX) Weekly療法		臨床区分	抗癌剤適応分類	登録日	2012年12月1日	
疾患名	乳癌		<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療 <input type="checkbox"/> 単施設自主研究 <input type="checkbox"/> 他施設自主研究 <input type="checkbox"/> 市販後臨床研究 <input type="checkbox"/> 治験	<input type="checkbox"/> 進行・再発化学療法 <input type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> 術前化学療法 <input type="checkbox"/> 局所療法 <input type="checkbox"/> その他	1クール期間	21日	
診療科名	乳腺・甲状腺外科				実施回数	/回	
登録医師名	野村 長久						

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	—	—	day8	—	—	—	—	—	—	
1	レスタミンコーワ錠 10mg	5	錠	経口			●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	パクリタキセル投与開始30分前までに内
2	生理食塩液	100	mL				●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	
3	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを 装着すること
3	デキサート注射液 6.6mg ファモチジン注射液 20mg	1 1	瓶 管				●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	
5	グラニセトロン点滴静注液3mgバック	1	袋	点滴静注	側管	15min	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	レスタミンと同時投与（レスタミン内服 不可患者には医師に確認）
6	5%糖液	250	mL				●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	
6	パクリタキセル注	100	mg/m2	点滴静注	側管	60min	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	フィルター付き点滴セット使用
7	生理食塩液	100	mL				●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	
7	ゲムシタピン点滴静注用	1000	mg/m2	点滴静注	側管	30min	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	
8																	

備考欄

減量・中止基準

文献