

## 国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	<b>乳癌 GT (GEM+PTX) 療法</b>						臨床区分	抗癌剤適応分類						登録日	2012年12月1日			
疾患名	乳癌									<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療		<input type="checkbox"/> 進行・再発化学療法				1クール期間	21日	
診療科名	乳腺・甲状腺外科									<input type="checkbox"/> 単施設自主研究		<input type="checkbox"/> 術後化学療法						
登録医師名	野村 長久			<input type="checkbox"/> 他施設自主研究		<input type="checkbox"/> 術前化学療法		<input type="checkbox"/> 局所療法										
						<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究		<input type="checkbox"/> その他		実施回数		/回						
Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント	
							day1	—	—	day8	—	—	—	—	—	—		—
1	レスタミンコーワ錠 10mg	5	錠	経口			●	—	—	—	—	—	—	—	—	バクリタキセル投与開始30分前までに内		
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	●	—	—	—	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを 装着すること		
3	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	15min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	レスタミンと同時投与（レスタミン内服 不可患者には医師に確認）		
	テキサート注射液 6.6mg	3	瓶															
4	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	15min	—	—	—	●	—	—	—	—	—			
	テキサート注射液 6.6mg	1	瓶															
5	グラニセトロン点滴静注液3mgパック	1	袋	点滴静注	側管	30min	●	—	—	—	—	—	—	—	—			
6	5%糖液	500	mL	点滴静注	側管	180min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	フィルター付き点滴セット使用 バクリタキセル濃度（0.3～ 1.2mg/mL）になるように調製（液量		
	バクリタキセル注	175	mg/m2															
7	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	30min	●	—	—	●	—	—	—	—	—			
	ゲムジタビン点滴静注用	1250	mg/m2															
8																		

備考欄

減量・中止基準

文献