

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	乳癌 weekly PTX療法						臨床区分	抗癌剤適応分類						登録日	2012年12月1日			
疾患名	乳癌									<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療		<input type="checkbox"/> 進行・再発化学療法				1クール期間	7日	
診療科名	乳腺・甲状腺外科									<input type="checkbox"/> 単施設自主研究		<input type="checkbox"/> 術後化学療法		<input type="checkbox"/> 術前化学療法				
登録医師名	野村 長久									<input type="checkbox"/> 他施設自主研究		<input type="checkbox"/> 治験						
Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント	
1	レスタミンコーウ錠 10mg	5	錠	経口			day1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	バクリタキセル投与開始30分前までに内
							●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	5%糖液	100	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	レスタミンと同時投与（レスタミン内服 不可患者には医師に確認）
							●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	15min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	レスタミンと同時投与（レスタミン内服 不可患者には医師に確認）
	デキサート注射液 6.6mg	1	瓶				●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	ファモチジン注射液 20mg	1	管	点滴静注	側管	30min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	グラニセトロン点滴静注液3mgパック	1	袋				●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	5%糖液	250	mL	点滴静注	側管	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	フィルター付き点滴セット使用
	バクリタキセル注	80	mg/m ²				●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6																		

備考欄

減量・中止基準

【中止基準】

初回 白血球数<3000/mm³ or 好中球数<1500mm³
2回目以降 白血球数<2000/mm³ or 好中球数<1000mm³

【減量の目安】

白血球数<1000/mm³ 60mg/m²へ減量

【肝機能低下例に対する減量の目安】

- ①AST及びALTが10×施設正常上限(ULN)未満かつ、血清ビリルビン:1.26~2×ULNで25%減量
- ②AST及びALTが10×施設正常上限(ULN)未満かつ、血清ビリルビン:2.01~5×ULNで50%減量
- ③AST及びALTが10×施設正常上限(ULN)以上、又は、血清ビリルビン:5×ULNを超える場合は中止

文献