

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	乳癌 2週毎 TRA+VNR療法		臨床区分 <input checked="" type="checkbox"/> 日常診療 <input type="checkbox"/> 単施設自主研究 <input type="checkbox"/> 他施設自主研究 <input type="checkbox"/> 市販後臨床研究 <input type="checkbox"/> 治験	抗癌剤適応分類 <input type="checkbox"/> 進行・再発化学療法 <input type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> 術前化学療法 <input type="checkbox"/> 局所療法 <input type="checkbox"/> その他	登録日	2012年12月1日
疾患名	乳癌					
診療科名	乳腺・甲状腺外科					
登録医師名	野村 長久					
					1クール期間	14日
					実施回数	/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
2	グラニセトロン点滴静注液3mgバック	1	袋	点滴静注	メイン	30min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	デキサート注射液 6.6mg	1	瓶														
3	生理食塩液	50	mL	点滴静注	メイン	全開	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	ロゼウス注	25	mg/m2														
4	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン	全開	●										静脈炎予防の為ロゼウス終了後全開で全量投与すること
5	生理食塩液	250	mL	点滴静注	メイン	90min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	初回投与時のみ4mg/kg 2回目以降2～3mg/kg 初回投与の忍容性があれば、投与時間30minまで短縮可能
	トラスツスマブ点滴静注	4	mg/kg														
		2回目以降：2～3	mg/kg														

備考欄

文献

減量・中止基準